

El impacto de un historial de experiencias infantiles adversas en el inicio y la exclusividad de la lactancia materna: Resultados de una encuesta nacional de salud de la población.

Traducción Libre en Español

Por: Ugochinyere Vivian Ukah, Prince A. Adu, Dane A. De Silva and Peter von Dadelszen
Breastfeeding Medicine, Vol. 11, No.10 / Publicado el 1ro de Diciembre 2016

CITAR EL ARTICULO

Ugochinyere Vivian Ukah, Prince A. Adu, Dane A. De Silva, and Peter von Dadelszen.
Breastfeeding Medicine. Dec 2016.544-550.

<http://doi.org/10.1089/bfm.2016.0053>

- **Published in** Volume: 11 Issue 10: December 1, 2016
- **Online Ahead of Print:** October 11, 2016

Resumen

Antecedentes: La Organización Mundial de la Salud recomienda encarecidamente la lactancia materna exclusiva. Dada la baja tasa de lactancia materna exclusiva en Canadá y el aumento de los informes sobre antecedentes de experiencias adversas en la infancia, este estudio pretendía investigar la asociación entre los antecedentes de experiencias adversas en la infancia y el inicio de la lactancia materna y la lactancia materna.

Materiales y métodos: Los datos utilizados para este estudio se basaron en la Encuesta de Salud de la Comunidad Canadiense 2011-2012, recogida mediante una encuesta transversal. Las medidas de resultado fueron el inicio de la lactancia materna y la lactancia materna exclusiva durante 6 meses o más. La historia de experiencias adversas en la infancia fue la principal variable explicativa. Se desarrollaron modelos de regresión logística multivariable para investigar el efecto sobre el inicio de la lactancia materna y sobre la lactancia materna exclusiva en las mujeres que dieron a luz dentro de los 5 años anteriores a cuando se realizaron las encuestas.

Resultados: La muestra del estudio incluyó 697 y 633 mujeres para los análisis sobre el inicio de la lactancia materna y la lactancia materna exclusiva hasta 6 meses en este estudio fue del 96,8% y del 42,8%, respectivamente. Tras controlar la edad y el nivel educativo más alto, tener antecedentes de experiencias adversas en la infancia no se asoció significativamente con el inicio de la lactancia (odds ratio [OR] 0,46, intervalo de confianza [IC] del 95%: 0,10-1,87), pero las madres con dichos antecedentes tenían menos probabilidades de dar el pecho de forma exclusiva hasta los 6 meses en comparación con las que no los tenían (OR 0,53, IC del 95%: 0,31-0,90).

Conclusiones: Estos resultados sugieren la necesidad de más programas de seguimiento de la lactancia materna más allá del entorno hospitalario para proporcionar más apoyo a las madres canadienses, especialmente a las que han experimentado experiencias adversas en la infancia o traumas en el pasado.

**Para seguir leyendo este artículo por completo, deberán leer la versión original en inglés. A continuación, encontrarán el enlace al artículo de publicación original.*

NOTA: La traducción libre es una traducción que, respetando el sentido del texto, no sigue fielmente la forma de expresión de la obra original. Los datos y conocimientos del texto no se han alterado y siguen siendo fieles al texto original. Sin embargo, al no ser una traducción oficial del autor se recomienda leer la fuente original en su idioma original si es posible.

Enlace a la publicación Original:

<https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/bfm.2016.0053?journalCode=bfm>

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:

NO reclamamos ningún derecho intelectual sobre el contenido o la información presentada aquí. Todo el contenido/información presentado aquí es propiedad de sus autores originales y/o entidades editoras.
Utilícese únicamente para fines educativos.